

# Opalene

- ▶ INSETTICIDA A BASE DI OLIO MINERALE AD ELEVATA RAFFINAZIONE
- ▶ ATTIVO PER CONTATTO ED ASFISSIA



## COMPOSIZIONE

olio di paraffina  
(CAS n° 8042-47-5) 80% (688 g/l)  
(insulfonabilità minima 99%)

## CODICE IRAC

NC

## FORMULAZIONE

emulsione olio/acqua (EW)

## BUFFER ZONE

Non previste

## INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: EUH401

## REG. MIN. SALUTE

n° 7922 del 16.05.1990

## SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI
Agrumi	Cocciniglie	2-3 l/hl trattamenti con gemme chiuse o ad inizio rigonfiamento  1-2 l/hl nei trattamenti al verde  300 ml/hl in associazione ad altri insetticidi	Trattamenti invernali tra raccolta e pre-fioritura  Trattamenti estivi da giugno (frutto noce) ad inizio invaiatura  Trattamento consigliati a fine inverno (rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile estivo al primo apparire delle infestazioni	20 gg
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Vite, Olivo, Ornamentali in pieno campo				

FLACONE  
1 litro (cartone 10 pz)

TANICA  
5 litri (cartone 4 pz)

TANICA  
25 litri



## AVVERTENZE

Non compatibile con poltiglia bordolese, polisolfuri, zolfo, meptyldinocap, captano; distanziare i trattamenti di 14-21 gg (sufficienti 7-14 gg nel caso dello zolfo).  
Non applicare su colture stressate o con temperature elevate (superiori a 32-34°C).

